



**КАУСТОБІОЛІТИ** — горючі викопні гірські породи органічного походження (вугілля, горючі сланці, нафта, торф, озокерит тощо). Назву запропонував 1888 нім. геолог Р. Потоньє. За походженням К. поділяють на 3 групи: сапропеліти (виникли внаслідок поховання на дні водоймищ нижчих організмів, переважно планктон. водоростей; горючі сланці, вугілля типу богхед), гуміти

(утворилися із залишків вищих, переважно болотяних, рослин; вугілля буре та кам'яне); ліптобіоліти (вугілля, збагачене найбільш стійкими компонентами рослин. речовини, — смолами, воском, кутикулою та ін.). Зустрічаються змішані типи К. — сапрогуміти, ліптосапропеліти (кеннель) тощо. Нині за умовами утворення виділяють К. вугіл. і нафт. рядів.

*В. С. Білецький, В. І. Павлишин*

#### **Бібліографічний опис:**

Каустобіоліти / В. С. Білецький, В. І. Павлишин // *Енциклопедія Сучасної України* [Електронний ресурс] / Редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. — Режим доступу: <https://esu.com.ua/article-11112>

2001-2026 © Ця енциклопедична стаття захищена авторським правом згідно з чинним законодавством України ([докладніше](#)).