



ГОРБИСТО-МОЧАЖИННИЙ КОМПЛЕКС — болотний комплекс погорбованих підвищень, часто вкритих пригніченою сосною, та обводнених мочажин. Характерний для мішаних лісів зони. В Україні є на Зх. Поліссі, зокрема найбільше за площею болото з Г.-м. к. — Сира Погоня (Рокитнів. р-н Рівнен. обл.), нині у складі Рівненського природного заповідника. Горби тут

овально-видовжені, вкриті розрідженою сосною. У трав'яно-чагарничковому покриві переважають пухівка піхвова, багно, андромеда, журавлина на сфагнових мохах. Обводнені мочажини вузькі, мають звивисту форму. Тут на напівзанурених сфагнових мохах переважають рослини драговин — осока багнова, ринхоспора біла, бобівник, шейхцерія болотна.

Т. Л. Андрієнко

Бібліографічний опис:

Горбисто-мочажинний комплекс / Т. Л. Андрієнко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. — Режим доступу: <https://esu.com.ua/article-31086>

2001-2026 © Ця енциклопедична стаття захищена авторським правом згідно з чинним законодавством України ([докладніше](#)).