

М. М. Іванік

Ладинський вік і ярус

ЛАДИНСЬКИЙ ВІК І ЯРУС (від назви народу ладини, який живе на Сх. Швейцарії та прилеглий частині Італії) – верхній вік середньотріасової епохи тріасового періоду та відклади, що утворилися в той час. Назву 1892 запропонував австр. палеонтолог і геолог А. Бітнер. Ладин., або Ладиній, вік (Л. в.) тривав від 237,0±2,0 млн до 228,7 млн рр. тому. Ладин. ярус (Л. я.) підстеляється відкладами анізій. ярусу серед. відділу, перекривається відкладами карній. ярусу верх. відділу тріас. системи. У типовому розрізі Л. я. представлений мергелями з головоногими молюсками та прошарками вулканіч. туфів, які за простяганням переходять у доломіти та рифові вапняки з коралами і диплопорами. Відклади Л. я. поширені на Сх.-європ. платформі, у Зх. Європі, на Далекому Сході, у Серед. Азії, Малій Азії і Пн. Америці. В Україні відклади Л. в. виявлені у Складчастих Карпатах, Закарп. прогині, Добруджі, Дніпров.-Донец. западині, Донбасі, Криму, пн. частині Чорного і центр. частині Азов. морів. У Складчастих Карпатах, Закарп. прогині, Криму, пн. частині Чорного і центр. частині Азов. морів у ладин. час утворювалися мор. відклади, у Дніпров.-Донец. западині та Донбасі переважали озерно-болотні і річк. строкато колірні глини, піски і пісковики. У Закарп. прогині відклади Л. я. представлені теригенно-карбонат. (Ужгород.-Солотвин. зона) і вулканогенно-териген. (Припанон. зона) товщами; у Складчастих Карпатах – вапняками, доломітами, вапняк. та доломіт. брекчіями, кварц. пісковиками; у Добруджі – брекчійов. вапняками, часто доломітизованими з прошарками мергелів, алевролітів і пісковиків; у Рівнин. Криму – товщею брекчієподіб., перекристаліз. вапняків. Із органіч. решток у відкладах Л. я. виявлені головоногі та двостулкові молюски, брахіоподи, форамініфери, радіолярії, конодони, остракоди, харові водорості, спори і пилок. Через спорадичні знахідки й обмаль ортостратигр. груп і видів вузького стратигр. поширення в окремих регіонах виділяють місц. стратигр. підрозділи: світи та товщі. За віком вони охоплюють декілька ярусів, тому точно встановити межі Л. я. та його потужність проблематично. Орієнтовно товщина ладин. відкладів складає 50–500 м. Див. також *Мезозойська ера і група, Тріасовий період і тріасова система.*

Рекомендована література

1. Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України. Т. 1. Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України. К., 2013.

Бібліографічний опис:

Ладинський вік і ярус / М. М. Іванік // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу: <https://esu.com.ua/article-52909>

2001-2024 © Ця енциклопедична стаття захищена авторським правом згідно з чинним законодавством України ([докладніше](#)).